Informed consent for endodontic treatment

Date: / /

The goal of root canal treatment (RCT) is to save a tooth that might otherwise require extraction. Although root canal treatment has a very high success rate, as with all medical and dental procedures, it is a procedure whose results cannot be guaranteed. Further, root canal treatment is performed to correct and apparent problem and occasionally and unapparent, undiagnosed or hidden problem may arises.

This procedure going will not prevent future decay, tooth fracture or gum disease, and occasionally a tooth that has had RCT may require re-treatment, endodontic surgery or tooth extraction. If we feel your RCT requires skills beyond our training, we will refer you to a specialist.

Risks: are unlikely, but may occur. They might include but are not limited to:

- Instrument separation in the canal
- Perforations (extra openings) of the canal with instruments.
- Blocked root canals that cannot be ideally completed.
- Incomplete healing of periapical lesion.
- Post-operative infection requiring additional treatment or the use of antibiotics.
- Tooth and/or root fracture that may require extraction.
- Fracture, chipping, or loosening of existing tooth or crown.
- Post-treatment discomfort.
- Temporary or permanent numbness.
- Change in the bite or jaw joint difficulty (TMJ problems of TMD).
- Reactions to anesthetics, chemicals or medications.
- It is known to me that medical problems may occur if I do not have the root canal completed.

Other treatment choices: the following other treatment options might be possible:

- No treatment at all.
- Waiting for more definitive/aggressive/severe/null development of symptoms.
- Extraction: to be removed and replaced with either nothing, a denture, a bridge or an implant.

After the completion of root canal procedure, I will require permanent restoration (filling, crown, onlay). Failure to have the tooth properly restored in a timely manner (within 15 days) significantly increases the possibility of failure of the root canal procedure or tooth fracture. Regular 6 monthly follow ups are mandatory for evaluating the health of the treated and adjacent teeth.

I have had an opportunity to ask questions of my treating doctor and I am satisfied with the answers that I have received. I promise to pay the fees and for the procedure during/ after completion of treatment. I consent to the procedure.

Patient Name :		Patient's sign:
Tooth#:	probable prognosis:	

एंडोडॉन्टिक उपचारांसाठी सूचित संमती

रूट कॅनल ट्रीटमेंट (RCT) चे ध्येय आहे दात जतन करणे, ज्यास अन्यथा काढण्याची आवश्यकता असू शकते. जरी सर्व वैद्यकीय आणि दंत प्रक्रियांप्रमाणे रूट कॅनाल उपचारात खूप उच्च यश दर आहे, ही एक अशी प्रक्रिया आहे, ज्याच्या परिणामांची हमी देता येत नाही. पुढे, रूट कॅनाल उपचार योग्य आणि स्पष्टपणे दिसणारी समस्या उपचारासाठी केले जाते आणि कधीकधी आणि अदृश्य, निदान न केलेली किंवा लपलेली समस्या उद्भव शकते.

रूट कॅनाल उपचार भविष्यात किडणे, दात फ्रॅक्चर किंवा हिरड्याचा रोग टाळणार नाही आणि कधीकधी दात ज्याला आरसीटी होते त्याला पुन्हा उपचार, एंडोडॉन्टिक शस्त्रक्रिया किंवा दात काढण्याची आवश्यकता असू शकते.

जर आम्हाला वाटत असेल की तुमच्या RCT ला आमच्या प्रशिक्षणापलीकडे कौशल्य आवश्यक आहे, तर आम्ही तुम्हाला तज्ञांकडे पाठवू शकते.

धोके: संभवत नाहीत, पण येऊ राकतात. धोके समाविष्ट करू राकतात परंतु मर्यादित नाहीत:

- 🕨 रूट कॅनालमध्ये इन्स्ट्मेंट सेपरेशन उद्भव शकतात
- > हाडात रूट कॅनलचाँ extra opening उद्भव राकतात
- 🕨 रूट कॅनल्स जे आधीच बंद आहेत (कॅल्सफाइड) ते आदर्शपणे पूर्ण केले जाऊ शकत नाहीत.
- अपूर्ण जखंम भरणे उद्भव शकतात.
- पोस्टऑपरेटिव्ह संसर्ग ज्यासाठी अतिरिक्त उपचार िंकवा प्रतिजैविकांचा वापर आवश्यक आहे
- > दात आणि/किंवा रूट फ्रॅक्चर ज्याला काढण्याची आवश्यकता असू शकते.
- > दात किंवा दात crown फ्रॅक्चर, चिपिंग किंवा सैल होणे.
- > उपचारानंतरची अस्वस्थता उद्भवू शकतात.
- > तात्पुरते किंवा कायमचे सुन्न होणे.
- दात बंद होण्यातील बदल आणि जबडाच्या सांध्यातील अडचण (TMJ च्या किंवा TMD समस्या) उद्भवू शकतात.
- 🕨 जर मी रूट कॅनल उपचार पूर्ण केला नाही तर वैद्यकीय समस्या उद्भवू शकतात.
- » भूल देण्याचे इंजेक्शन, रसायने किंवा Rct साठीच्या औषधांवर प्रतिक्रिया उद्भवू शकतात.

इतर उपचार पर्याय: खालील इतर उपचार पर्याय शक्य असू शकतात:

- > मुळीच उपचार नाही (No Treatment at all).
- > लक्षणांच्या(Symptoms) अधिक निश्चित विकासाची वाट पाहणे.
- 🕨 दात काढणे: त्यानंतर एकतर काहीही न करता, एक दात, bridge किंवा dental implant करणे .

मला माहित आहे की Rct प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, मी कायमस्वरूपी दात भरणे वेळेत आवश्यक आहे (दात भरणे, दातांची टोपी, onlay/inlay)

(30 दिवसांच्या आत). योग्य रीतीने दात भरणे अयशस्वी झाल्यास Rct प्रक्रिया अयशस्वी किंवा दात फ्रॅक्चर होण्याची शक्यता लक्षणीय वाढते. उपचारित आणि जवळच्या दातांच्या आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी नियमित ६ मासिक पाठपुरावा(6 monthly follow up) अनिवार्य आहे.

मला माझ्या उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना सर्वे प्रश्न विचारण्याची संधी मिळाली आहे आणि मला मिळालेल्या उत्तरांवर मी समाधानी आहे. मी ट्रिएटमेंट दरम्यान/नंतर प्रक्रियेसाठी फी भरण्याचे वचन देतो

मी प्रक्रियेला संमती देतो.

रुग्णाचे नाव: रुग्णाची स्वाक्षरी: